

WOBENZYM® DAS ORIGINAL

Die systemische Enzymtherapie mit
studienbelegter Wirksamkeit¹



Indikationen


Entzündungshemmendes Arzneimittel (Antiphlogistikum).
Angewendet zur unterstützenden Behandlung von Erwachsenen bei:

- Entzündungen, Schwellungen oder Schmerzen als Folge von Traumen
- Schmerzhaft und aktivierte Arthrosen und Weichteilrheumatismus
- Thrombophlebitis
- Entzündung des Urogenitaltraktes

Die in Wobenzym® enthaltene Enzymkombination wirkt abschwellend und entzündungsregulierend, dadurch wirkt es ursächlich und unterdrückt nicht nur die Symptome.

Dosierung und Einnahme

- Tagesdosis 6–12 Tabletten, z.B. 2 × 3 oder 2 × 6 Tabletten täglich.
- Erfahrungsgemäß empfiehlt sich eine Einnahme von 2 × 6 Tabletten täglich in der 1. Woche und 2 × 3 Tabletten täglich ab der 2. Woche.
Als Kur über 2 Monate: 2 × 3 Tabletten täglich.



Mind. 30 Minuten
vor dem Essen

oder

Mind. 90 Minuten
nach dem Essen

Für eine optimale Wirkung sollte die Einnahme außerhalb der Mahlzeiten erfolgen, mindestens 30 Minuten vor oder mindestens 90 Minuten nach dem Essen. Die maximale Dosis von 12 Tabletten täglich soll nicht überschritten werden.

Dauer der Anwendung

- Bei akuten Entzündungen* bis zum völligen Abklingen der Beschwerden
- Bei chronischen / rezidivierenden Erkrankungen nach Ermessen des Therapeuten
- Zur Langzeittherapie geeignet, Anwendung ohne ärztlichen Rat nicht länger als 14 Tage

Inhaltsstoffe von Wobenzym®

Wirkstoffe pro Tablette

Bromelain	67,5–76,5 mg eingestellt auf 450 F.I.P Einheiten
Trypsin	32–48 mg eingestellt auf 24 µkat
Rutosid-Trihydrat	100 mg

Liste sonstiger Bestandteile

Lactose-Monohydrat, vorverkleisterte Stärke (Mais), Magnesiumstearat [pflanzlich], Stearinsäure, gereinigtes Wasser, hochdisperses Siliciumdioxid, Maltodextrin, Talkum

Filmüberzug

Methacrylsäure-Methylmethacrylat-Copolymer (1:1), Titandioxid (E171), Macrogol 6000, Triethylcitrat, Vanillin

Produktvorteile

- Bei Schmerzen und Entzündungen*
- Effektives Enzympräparat mit Wirkstoffen natürlichen Ursprungs
- Aktiviert den körpereigenen Heilungsprozess durch die unterstützende Wirkung von Enzymen
- Bekämpft die Schmerzursache: die Entzündung*
- Langfristig gut verträglich¹

Lagerung

Nicht über 25 °C aufbewahren.
Vor Licht und Feuchtigkeit schützen.

Darreichungsform

Magensaftresistente Tabletten

Wobenzym®

Detailinformationen zu Wobenzym®

Gegenanzeigen

Wobenzym® darf nicht angewendet werden

- bei Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe, Ananas oder einen der genannten sonstigen Bestandteile
- bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren
- während der Schwangerschaft und Stillzeit
- bei Patienten mit angeborener oder erworbener Blutgerinnungsstörung (z.B. Hämophilie)
- bei Patienten mit schweren Nieren- und / oder Leberschäden
- bei Patienten, die unmittelbar vor einem chirurgischen Eingriff stehen (4 Tage vorher absetzen)
- bei gleichzeitiger Anwendung von Antikoagulanzen und / oder Thrombozytenaggregationshemmern

Wechselwirkungen

Die gleichzeitige Anwendung von Wobenzym® und Antikoagulanzen und / oder Thrombozytenaggregationshemmern ist kontraindiziert auf Grund einer möglichen Verstärkung des gerinnungshemmenden Effekts.

Nebenwirkungen

Gelegentlich: Völlegefühl; Flatulenz; Veränderung des Stuhls in Beschaffenheit, Farbe und Geruch; asthmaähnliche Beschwerden.
Selten: Beschwerden im Magen-Darm Trakt; Magen-Darm-Krämpfe; Ausschlag; Pruritus; Erythem; allergische Reaktionen. *Sehr selten:* Diarrhoe, Übelkeit, Erbrechen, Hungergefühl, Hyperhidrosis, Kopfschmerzen

Wichtige Hinweise

Nach dem auf dem Umkarton und dem Blister nach „verwendbar bis“ angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

Keine Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit / Bedienung von Maschinen.

Keine ausreichenden Untersuchungen bei Schwangeren, Stillenden und Kindern, daher darf Wobenzym® nicht angewendet werden.

Bestellinformationen

VE	Varianten	PZN
100 Stk.	Tabletten	13751831
200 Stk.	Tabletten	13751848
360 Stk.	Tabletten	13751854
800 Stk.	Tabletten	13751860

1 Ueberall MA, J Pain Res 2016; 9: 941-961

* Als Folge von Verletzungen, verschleißbedingten Gelenkentzündungen (aktivierten Arthrosen).

Wobenzym® magensaftresistente Tablette. Qualitative u. quantitative Zusammensetzung: *Wirkstoffe:* Bromelain, Trypsin, Rutosid-Trihydrat. 1 magensaftres. Tabl. enth. Bromelain 67,5–76,5 mg (eingest. auf 450 F.I.P.–Einh.), Trypsin 32-48 mg (eingest. auf 24 µkat), Rutosid-Trihydrat 100 mg. Sonst. Bestandt.: Lactose-Monohydrat, vorverkl. Stärke (Mais), Magnesiumstearat (pfl.), Stearinsäure, ger. Wasser, hochdisp. Siliciumdioxid, Talkum, Maltodextrin. *Filmüberzug:* Methacrylsäure-Methylmethacrylat-Copolymer (1:1), Titandioxid (E 171), Macrogol 6000, Talkum, Triethylcitrat, Vanillin. **Anwendungsgebiete:** Z. unterstütz. Behandl. v. Erw. b.: Entzünd., Schwell. o. Schmerz. als Folge v. Traumen; Thrombophlebitis; Entzünd. d. Urogenitaltraktes; schmerz. u. aktiviert. Arthrosen u. Weichteilrheumatismus. **Gegenanzeigen:** Überempf. geg. d. Wirkstoffe, Ananas o. e. d. sonst. Bestandt.; Kinder u. Jugendl. < 18 Jahren; Schwangerschaft u. Stillzeit; b. Pat. m. angeb. o. erworbt. Blutgerinnungst., z. B. Hämophilie; schw. Leber- u./o. Nierenschäden; unmittelbar v. e. chirurg. Eingriff; gleichz. Anw. v. Antikoagulanzen u./o. Thrombozytenaggregationshemmern. **Nebenwirkungen:** *Gelegentlich:* Völlegef., Flatulenz, Veränd. d. Stuhls i. Beschaffenh., Farbe u. Geruch; asthmaähnl. Beschw. *Selten:* Beschw. i. Magen-Darm Trakt, Magen-Darm-Krämpfe, Ausschlag, Pruritus, Erythem, allerg. Reakt. *Sehr selten:* Diarrhoe, Übelkeit, Erbrechen, Hungergef., Hyperhidrosis, Kopfschmerz. **Warnhinweis:** Enth. Laktose. **Inhaber der Zulassung:** MUCOS Pharma GmbH & Co. KG, Miraustraße 17, 13509 Berlin. **Stand der Information:** 06/2017. **Apothekenpflichtig.**